

## Western封闭液(尼龙膜)

产品货号: R21556

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

Western封闭液(尼龙膜)即Western Blocking Buffer主要由TBS、脱脂奶粉、BSA、Antifoam A等组成。可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的尼龙膜的封闭,不适用于PVDF膜或NC膜的封闭。封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合,降低背景,增强信噪比。每张膜封闭大约需要10ml封闭液。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Western封闭液(尼龙膜)	100ml/500ml	4℃

### 自备材料:

1. TBST或Western洗涤液
2. 摇床

### 操作步骤(仅供参考):

1. 蛋白印迹转膜后加入Western洗涤液,在摇床上摇动洗涤蛋白膜1~2min。
2. 取恰当容量的容器加入Western封闭液(尼龙膜),在摇床上摇动室温封闭60min。
3. 直接进行一抗孵育等后续操作。

### 注意事项:

1. 如果对于一些背景非常高的抗体,可以4℃封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com