

Gluta固定液（4%）

产品货号：R23177

产品规格：500ml

产品简介：

固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。Gluta固定液会引起蛋白质 α -螺旋结构变形，不利于过氧化物酶染色，速速度快，渗透力差。

Gluta固定液(4%)主要由Gluta、磷酸盐等组成，pH7.2~7.4，该固定液对细胞核、细胞浆的细微结构固定效果好，是最常用的标准Gluta固定液，经常用于电镜标本的固定。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件
Gluta固定液（4%）	500ml	2-8℃

操作步骤(仅供参考)：

1. 按实验具体要求操作。
2. 取新鲜标本，立即入Gluta固定液(4%)中，4℃固定1~4h，稍大标本应适当延长固定时间。
3. 送检或 4℃保存。

注意事项：

1. Gluta固定液(4%)有一定腐蚀性，请在通风较好的环境下小心操作，避免吸入。
2. 组织取材的厚度不同，固定时间也不同。常规活检组织比较适合厚度为2~4mm，一般不超过6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。如果容积不够大，可以在固定期间更换1~3次固定液。
4. 取出新鲜组织后，应及时固定。无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。

有效期：6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com