

## 改良油红O染色液

产品货号: R23052

产品规格: 2×50ml/2×100ml

### 产品简介:

脂质(Lipid)是中性脂肪、类脂及其衍生物的总称,其共同的物理特性是不溶于水,易溶于有机溶剂(例如乙醇、乙醚等)。人体的脂肪主要有两种:1、储存脂肪,如中性脂肪,主要分布于皮下、肾、胰腺等部位。2、结构脂肪,如类脂(磷脂、糖脂、胆固醇等),主要分布于细胞内。

中性脂肪(Neutral fat)是由三分子脂肪酸和一分子甘油组成的脂类,呈中性。中性脂肪是储存能量的方式之一,在氧化时释放出能量。中性脂肪染色经常采用苏丹II、苏丹III、苏丹IV、苏丹黑B、油红O法等。传统方法中,常采用苏丹染料,最近发现偶氮染料油红O更适合脂肪的染色。油红O是很强的脂溶剂和染脂剂,较易与甘油三脂结合呈小脂滴状,与磷脂结合力稍差。其染色原理一般认为是物理上的溶液作用或吸附作用,借溶液作用使脂肪染色。染料在冰冻切片内脂质的溶解度较在原溶剂中的溶解度更大,所以在染色时染料就从有机溶剂转移入脂质而使脂肪染色。

改良油红O染色液主要用于显示组织器官的脂肪变性和类脂质的异常沉着,常发生于肝、肾、心等实质脏器的脂肪变性,细胞内出现多数中性脂肪滴;鉴别和诊断脂肪组织中所发生的肿瘤及其性质。标本不采用含有乙醇的固定液(如需要固定可采用10%的福尔马林)、也不采用石蜡切片,需用冰冻切片或碳蜡切片。脂肪的阳性染色结果呈橘黄至红色,但具体颜色因脂质浓度而定。

### 产品组成:

试剂名称		2×50ml	2×100ml	保存条件
试剂(A): 改良Oil red O stain	A1: Oil red O stain A	30ml	60ml	4℃, 避光
	A2: Oil red O stain B	20ml	40ml	室温
临用前,按A1:A2=3:2比例混合,静置10min,即获得改良Oil red O Stain,不宜提前配制。				
试剂(B): Mayer苏木素染色液		50ml	100ml	4℃, 避光

### 自备材料:

1. 60%的异丙醇
2. 蒸馏水
3. 1%的盐酸溶液
4. 稀碳酸锂溶液
5. 甘油明胶或阿拉伯糖胶

### 操作步骤(仅供参考):

1. 冰冻切片厚度6~10 μm,不固定或10%福尔马林固定10min后水洗。
2. 切片入蒸馏水中稍冲洗。
3. 切片入60%的异丙醇内浸洗20~30s。
4. 切片入改良油红O染色液中(加盖),密闭染色10~15min。
5. 分色:入60%的异丙醇内稍洗以便去除染液。
6. 入蒸馏水中稍微清洗。
7. Mayer苏木素染色液复染核1~2min。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

8. (可选)1%的盐酸溶液稍微分化一下。
9. (可选)自来水漂洗 10min 或稀碳酸锂溶液中促蓝。
10. 入蒸馏水中稍微清洗。
11. 用滤纸吸干周围水分。
12. 甘油明胶或阿拉伯糖胶封固。

#### 染色结果:

中性脂肪	橙红色或橘红色
细胞核	蓝色

#### 注意事项:

1. 改良油红O染色液不够稳定，易产生沉淀，不宜提前配制。
2. 如果60%的异丙醇不易获得，亦可采用70%的乙醇。
3. 由于脂肪易溶于有机溶剂，所以显示脂肪一般不能像石蜡切片一样处理，而通过冰冻切片染色来显示。
4. 作脂肪染色的冰冻切片不可太薄，过薄的切片常会使脂质丢失。
5. Mayer苏木素染色液复染时间不能过长。
6. 染色结果不能长期保存，应尽快观察及照相。
7. 甘油明胶封固的样本，保存时间不长。如需长期保存，可以在盖玻片与载玻片交界的边缘用中性树胶封闭。
8. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期:** 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>