

## Western封闭液

产品货号: T15216

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

Western封闭液即Western Blocking Buffer, 可用于蛋白印迹中转移了蛋白样品的PVDF膜或NC膜的封闭, 主要由TBS、BSA、防腐剂等组成。封闭后可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合, 降低背景, 增强信噪比。每张膜封闭大约需要10~15ml封闭液。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
Western封闭液	100ml/500ml	2-8℃

### 自备材料:

1. TBST或Western洗涤液
2. 摇床

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 蛋白印迹转膜后加入Western洗涤液, 在摇床上摇动洗涤蛋白膜1~2min。
2. 取恰当容量的容器加入Western Blocking Buffer, 在摇床上摇动室温封闭60min。
3. 直接进行一抗孵育等后续操作。

### 注意事项:

1. 如果对于一些背景非常高的抗体, 可以4℃封闭过夜。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 2个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>