

Lillie二价铁染色液

产品货号: R22083

产品规格: 2×50ml

产品简介:

含铁血黄素(Hemosiderin)是一种血红蛋白源性色素，为金黄色或棕黄色颗粒，因其含铁，且为金黄色，故称为含铁血黄素。当红细胞被巨噬细胞吞噬后，在溶酶体酶的作用下，血红蛋白被分解为不含铁的橙色血质和含铁的含铁血黄素。

Perls 普鲁士蓝反应(Prussianblue reaction)又称为含铁血黄素染色，即经过亚铁氰化钾和稀酸处理后可以产生蓝色，常见于吞噬细胞或间质内，主要显示三价铁盐。在极少数情况下，铁存在于其还原态的亚铁之中，Lillie法是显示二价铁的很好的方法，其特异性较好。

产品组成:

名称		规格	保存条件
试剂(A)	A1:Lillie 二价铁 A 液	25ml	室温
	A2:Lillie 二价铁 B 液	25ml	室温
临用前，取 A1、A2 等量混合即为 Lillie stain，不宜提前配制。			
试剂(B): 核固红染色液		50ml	室温，避光

自备材料: 系列乙醇、蒸馏水、二甲苯或浸蜡脱蜡透明液、中性树胶封。

操作步骤:

- 组织固定于 10% 中性福尔马林或其他碱性固定液，常规脱水包埋。
- 切片厚度 4μm，常规二甲苯或浸蜡脱蜡透明液脱蜡至水，蒸馏水水洗。
- 切片入 Lillie stain (见注意事项 4)，浸染 25~30min。
- 蒸馏水充分冲洗 2~5min。
- 入核固红染色液，淡染细胞核 5~10min。
- 蒸馏水冲洗 1~5s。
- 常规脱水透，二甲苯或浸蜡脱蜡透明液透明，中性树胶封固。

染色结果:

二价铁	深藤氏蓝
细胞核、其他组织	红色

阴性对照(可选): 取相同对照切片脱蜡至水。结果为阴性。

注意事项:

- 该染色法适用于石蜡切片、冰冻切片和树脂切片，切片脱蜡应尽量干净。
- 组织固定常采用 10% 中性福尔马林，经普通福尔马林长期固定后，组织会有损伤。避免使用酸性固定剂，铬酸盐处理也会妨碍铁的保存。
- 整个操作过程中容器要干净，避免用金属铁制品，洗切片和容器时以蒸馏水为宜，因普通水内含铁质。
- Lillie stain 染色时，应根据样本情况调整着色时间。
- 所有切片都应使用同一个阳性对照切片，选择适合的对照非常重要。尸检肺组织是一个很好的对照，包含相当数量的铁阳性巨噬细胞(心衰细胞)。
- 系列乙醇应经常更换新液。
- 冰冻切片和细胞的染色，最好根据具体情况摸索实验条件。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号
电话:400-611-0007 13671551480
Q Q: 807961520
邮箱: saintbio@126.com
http://www.saint-bio.com