

乙酰胆碱转移酶（ChAT）活性试剂盒（微板法）

产品货号：BA2877

产品规格：48样

产品简介：

乙酰胆碱转移酶(Choline acetyltransferase ChAT, EC 2.3.1.6)是乙酰胆碱Ach的合成酶，调节Ach的代谢。Ach是调节食道平滑肌运动的主要的兴奋性神经递质。

ChAT的测定是以乙酰辅酶A和胆碱为底物，在ChAT的作用下，反应的生成乙酰胆碱和辅酶A，该产物和显色剂反应于412nm处有吸收峰，进而计算出ChAT的活力。

酶催化反应方程式：acetyl-CoA+choline=CoA+O-acetylcholine。

试剂盒组成：

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体60mL×1瓶	2-8°C	
试剂一	粉剂mg×1支	-20°C	临用前甩几下或离心使粉剂落入底部，再加1.2mL蒸馏水溶解备用，可-20°C分装冻存。
试剂二	粉剂mg×1支	2-8°C	临用前甩几下或离心使粉剂落入底部，再加2.3mL蒸馏水溶解备用，-20°C保存。
试剂三	液体12mL×1瓶	2-8°C	
试剂四	液体4mL×1瓶	2-8°C	若凝固，可在25°C水浴温育片刻至全部融解后使用。
标准品	粉剂1mg×1支	2-8°C	若重新做标曲，则用到该试剂。

所需仪器和用品：

酶标仪、台式离心机、可调式移液器、96孔板、研钵、冰和蒸馏水。

乙酰胆碱转移酶（ChAT）测定：

建议正式实验前选取2个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1. 样本制备：

(1) 组织样本：取约0.1g组织，加入1mL提取液，进行冰浴匀浆。12000rpm, 4°C离心10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照组织质量(g)：提取液体积(mL)为1: 5~10的比例进行提取。

(2) 细菌或细胞样本：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；取约500万细菌或细胞，加入1mL提取液，超声波破碎细菌或细胞(冰浴，功率20%或200W，超声3s，间隔10s，重复30次)；12000rpm, 4°C离心10min，取上清，置冰上待测。

【注】：若增加样本量，可按照细菌/细胞数量(10^4)：提取液(mL)为500~1000: 1的比例进行提取。

(3) 液体样本：直接检测；若浑浊，离心后取上清检测。

2. 上机检测：

(1) 酶标仪预热30min，设定波长到412nm。

(2) 所有试剂解冻至室温(25°C)或于水浴锅(25°C)孵育15-30min左右。

(3) 在96孔板中依次加入：

试剂(μL)	测定管	对照管
样本	20	20
试剂一	20	-
试剂二	20	20
试剂三	100	120
混匀，37°C孵育30min		



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com


<http://www.saint-bio.com>

试剂四	40	40
混匀，静置5min，于412nm处读取吸光值， $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ （每个样本做一个自身对照）。		

- 【注】：**1.若 ΔA 较小，可以增加37°C保温反应时间T（如增至1小时），或增加样本量V1（由20 μL 增至50 μL ，则试剂三相应减少），则改变后的T和V1需重新代入公式计算。
 2. ΔA 最好控制在标准曲线的线性范围内，若 ΔA 的值超过1，可对样本进行稀释再测定，稀释倍数D代入计算公式计算；或减少样本量V1（如减至5 μL ，则试剂三相应增加），或减少37°C反应时间T（如减至10min），则改变后的T、V1和稀释倍数D需重新代入公式计算。

结果计算：

1. 标准曲线方程为 $y = 0.0434x - 0.0161$ ；x为标准品摩尔质量（nmol），y为 ΔA 。



2. 按照样本质量计算：

酶活定义：每克组织每分钟催化产生1nmol辅酶A定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{ChAT活性(nmol/min/g鲜重)} &= [(\Delta A + 0.0161) \div 0.0434] \div (W \times V1 \div V) \div T \times D \\ &= 38.4 \times (\Delta A + 0.0161) \div W \times D \end{aligned}$$

3. 按照样本蛋白浓度计算：

酶活定义：每毫克组织蛋白每分钟催化产生1nmol辅酶A定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{ChAT活性(nmol/min/mg prot)} &= [(\Delta A + 0.0161) \div 0.0434] \div (Cpr \times V1) \div T \times D \\ &= 38.4 \times (\Delta A + 0.0161) \div Cpr \times D \end{aligned}$$

4. 按细胞数量计算：

酶活定义：每1万个细菌或细胞每分钟催化产生1nmol辅酶A定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{ChAT活性(nmol/min/10^4 cell)} &= [(\Delta A + 0.0161) \div 0.0434] \div (500 \times V1 \div V) \div T \times D \\ &= 38.4 \times (\Delta A + 0.0161) \div 500 \times D \end{aligned}$$

5. 按液体体积计算：

酶活定义：每毫升液体每分钟催化产生1nmol辅酶A定义为一个酶活力单位。

$$\text{ChAT活性(nmol/min/mL)} = [(\Delta A + 0.0161) \div 0.0434] \div V1 \div T \times D = 38.4 \times (\Delta A + 0.0161) \times D$$

W---样品质量，g； V---提取液体积，1mL；

V1---上清液体积（mL），0.02mL； T---反应时间，30min；

D---稀释倍数，未稀释即为1； 500---细胞数量，万； 辅酶A的分子量---Mr=767.53；

Cpr---上清液蛋白质浓度，mg/mL；建议使用本公司的BCA蛋白质含量测定试剂盒。

附：标准曲线制作过程：

- 制备标准品母液（2mg/mL）：用前甩几下使粉体落入底部，再加0.5mL蒸馏水溶解标准品（母液需在两天内用完且-20°C保存）。
- 把母液用蒸馏水稀释成以下浓度梯度的标准品：0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1mg/mL。
- 根据加样体系：20 μL 标准品+140 μL 试剂三+40 μL 试剂四，于412nm处测定；根据结果即可制作标准曲线。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com